

المفطورة التناسلية (Mycoplasma genitalium)

المعروفة أيضاً باسم MG

المفطورة التناسلية (MG) هي عدوى بكتيرية يمكن أن تنتقل أثناء ممارسة الجنس دون استخدام الواقي الذكري (الكوندوم).

حقائق سريعة

- المفطورة التناسلية هي من الأمراض المعدية المنقولة جنسياً التي تؤثر على عنق الرحم والإحليل/مجرى البول والشرج.
- لا يعاني معظم المصابين بالمفطورة التناسلية من أي أعراض على الإطلاق
- عادة ما يكون الفحص عبارة عن عينة بول أو مسحة من المهبل أو عنق الرحم أو الشرج
- يتم علاج المفطورة التناسلية بالمضادات الحيوية

ما هو؟ (What is this?)

المفطورة التناسلية (MG) هي من الأمراض المعدية المنقولة جنسياً التي تسببها البكتيريا وهي تؤثر على عنق الرحم والإحليل/مجرى البول والشرج.

كيف تُصابون به؟ (How do you get it?)

يمكن أن تنتقل المفطورة التناسلية عن طريق الاتصال الجنسي المهبلي والشرجي دون الواقي الذكري (كوندوم) مع شخص لديه المفطورة التناسلية.

ما هي الاعراض؟ (What are the symptoms?)

المهبل

إذا كان لديكم مهبل، فقد تعانين من:

- ألم في أسفل البطن
- ألم أثناء ممارسة الجنس
- إفرازات مهبلية غير عادية
- ألم عند التبول
- نزيف مهبلي غير طبيعي

القضيب

إذا كان لديكم قضيب، فقد تعانون من:

- ألم عند التبول
- إفرازات من القضيب

كيف يتم فحصكم للكشف عنه؟ (How do you test for it؟)

إذا كان لديكم مهبل، فعادة ما يكون الفحص عبارة عن عينة بول أو مسحة من المهبل أو عنق الرحم.

إذا كان لديكم قضيب، فعادة ما يكون الفحص عبارة عن عينة بول.

إذا كان لديكم التهاب في الشرج، فإن الفحص هو عبارة عن مسحة للشرج.

كيف يتم علاجه؟ (How is it treated؟)

عادة ما يتم علاج المפטورة التناسلية بمجموعتين من المضادات الحيوية. يجب تناول المجموعتين لعلاج العدوى.

بعد 2-3 أسابيع من تناول المضادات الحيوية، يجب إجراء الفحص مرة أخرى للتأكد من فعالية المضادات الحيوية.

يجب ألا تمارسوا الجنس أو يجب عليكم استخدام الواقي الذكري أو حاجز الأسنان المطاطي بنسبة 100% من الوقت لجميع الاتصالات الجنسية حتى تحصلون أنتم وشريككم (شركاءكم) على نتيجة فحص للمפטورة التناسلية سلبية.

كيف يمكنني حماية نفسي؟ (How can I protect myself؟)

يُعدّ استخدام الواقي الذكري أو حاجز الأسنان المطاطي أثناء ممارسة الجنس المهبلية أو الشرجية أفضل طريقة لحماية أنفسكم من الميساء المُعدية.

أخبروهم (Let them know)

عندما يتم تشخيص إصابتكم بمرض مُعدي منقول جنسياً، يجب أن يخضع جميع شركائكم الجنسيين من الأشهر القليلة الماضية للفحوصات من قبل الطبيب.

ومن المهم جداً أن يتم فحص جميع شركائكم الجنسيين (المنتظمين والعرضيين) لأنه إذا لم يتم علاج الأمراض المُعدية المنقولة جنسياً فقد تسبب مشاكل خطيرة لاحقاً.

إذا كنتم تواجهون صعوبة في إخبار شركائكم، يمكنكم استخدام Let Them Know (letthemknow.org.au) للحصول على نموذج حول المحادثات ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والرسائل الخطية التي يمكنكم إرسالها إلى شركائكم إما بشكل شخصي أو مجهول.

أين يمكنني الحصول على المساعدة؟ (Where can I get help?)

- قوموا بزيارة خدمة الصحة الجنسية بالقرب منكم
- قوموا بزيارة طبيبك المحلي
- قوموا بزيارة مركز صحة المجتمع المحلي

اعثروا على خدمات الصحة الجنسية عبر (staystifree.org.au) StaySTIFree

إخلاء المسؤولية (DISCLAIMER)

توفر صحيفة الحقائق هذه معلومات عامة عن الصحة الجنسية وليس المقصود بها أن تحل محل الحاجة إلى استشارة طبيبك.

إذا كانت لديكم مخاوف بشأن صحتكم، فيجب عليكم طلب المشورة من طبيبك.

إذا كنتم بحاجة إلى رعاية عاجلة، فيجب عليكم التوجه إلى أقرب قسم للطوارئ أو الاتصال برقم الطوارئ 000.