

生殖支原体(Mycoplasma genitalium)

亦称 MG

生殖支原体 (MG) 是一种细菌感染，通过不戴避孕套的性交传染。

资料快速一览

- 生殖支原体是影响宫颈、尿道和肛门的 STI
- 大多数感染生殖支原体的人没有任何症状
- 检查方法通常是尿样检查、阴道或宫颈拭子检查或肛门拭子检查
- 用抗生素治生殖支原体

这是什么病？ (What is this?)

生殖支原体 (MG) 是细菌引起的 STI，感染部位是宫颈、尿道和肛门。

你怎么会得这种病？ (How do you get it?)

MG 通过与有 MG 的人进行不戴避孕套的性交和肛交传染。

有哪些症状？ (What are the symptoms?)

阴道 (Vagina)

如果你有阴道，你有可能经历：

- 下腹疼痛
- 性交时疼痛
- 异常阴道分泌物
- 小便时疼痛
- 异常阴道出血

阴茎 (Penis)

如果你有阴茎，你有可能经历：

- 小便时疼痛
- 阴茎流分泌物

如何做检查？ (How do you test for it?)

如果你有阴道，检查方法通常是尿样检查、阴道或宫颈拭子检查。

如果你有阴茎，检查方法通常是尿样检查。

如果肛门感染，检查方法是肛门拭子检查。

如何治疗？ (How is it treated?)

MG 通常用两个疗程的抗生素进行治疗。要根治这个病，两个疗程都需要。

服用抗生素 2-3 周后你需要再做一次检查，确保抗生素起到了作用。

在你和你的伴侣得到阴性 MG 检查结果之前你要么不应该有性生活、要么在有性接触时要 100%戴避孕套或保护膜。

如何保护自己？ (How can I protect myself?)

性交和肛交时使用避孕套或保护膜是保护自己不得 MG 的最好办法。

告诉他们 (Let them know)

当你确诊得像这样的 STI 时，最近几个月所有性伴侣都应该让医生检查。

你所有的性伴侣（经常的和临时的）都要做检查，这非常重要，因为 STIs 不治的话以后有可能带来严重的问题。

如果你难以向你的伴侣启齿，你可以参考 [Let Them Know \(告诉他们\)](http://letthemknow.org.au) (letthemknow.org.au)里的谈话、电子邮件、短信和信函样本，亲自或匿名向你的伴侣传递这方面的信息。

去哪里寻求帮助 (Where can I get help?)

- 去你附近的性健康诊所
- 去看你本地的医生
- 去你本地的社区健康中心

查找性健康服务机构：StaySTIFree (staystifree.org.au)

免责声明 (DISCLAIMER)

本资料单提供普通性健康信息，其意图不是替代咨询医生的需要。

如果你担心你的健康问题，你应该去请教医生。

如果你有紧急需要，你应该去最近的急诊部或拨打 000。