

Mycoplasma genital (Mycoplasma genitalium)

También conocido como MG

El micoplasma genital (MG) es una infección bacteriana que se puede contagiar durante el contacto sexual sin preservativo.

DATOS BÁSICOS

- El micoplasma genital es una ITS que afecta al cérvix, la uretra y el ano
- La mayoría de las personas infectadas con micoplasma genital no presentan ningún síntoma
- El análisis es generalmente a través de una muestra de orina, un hisopado vaginal o cervical o del ano
- El micoplasma genital se trata con antibióticos

¿Qué es esto? (What is this?)

El micoplasma genital (MG) es una ITS causada por una bacteria que infecta el cérvix, la uretra y el ano.

¿Cómo se infecta uno? (How do you get it?)

El MG se contagia a través del sexo vaginal y anal sin preservativo con alguien que ya está contagiado.

¿Qué síntomas tiene? (What are the symptoms?)

La vagina (Vagina)

Si tienes vagina, puede que sientas:

- Dolor en la parte baja abdominal
- Dolor durante el coito
- Secreción vaginal anormal
- Dolor al orinar
- Sangrado vaginal anormal

El pene (Penis)

Si tienes pene, puede que sientas:

- Dolor al orinar
- Secreción del pene

¿Cómo me hago una prueba? (How do you test for it?)

Si tienes vagina, el análisis es generalmente a través de una muestra de orina, un hisopado vaginal o cervical.

Si tienes pene, el análisis es generalmente una muestra de orina.

Si tienes una infección anal, el análisis es un hisopado anal.

¿Qué tratamiento tiene? (How is it treated?)

El MG se trata normalmente con dos tandas de antibióticos. Hay que tomarse las dos tandas para curar la infección.

Pasadas 2 o 3 semanas desde la toma de antibióticos, tienes que volver a hacerte otro análisis para asegurarte de que han surtido efecto.

No deberías tener relaciones sexuales ni utilizar preservativos o protectores el 100% de las veces para todos los contactos sexuales hasta que tú y tu pareja deis negativo en el análisis de MG.

¿Cómo me puedo proteger? (How can I protect myself?)

Utilizar preservativos o protectores para el sexo vaginal y anal es la mejor forma de protegerte del MC.

Infórmales (Let them know)

Cuando te han diagnosticado una infección de transmisión sexual como ésta, todas tus parejas sexuales en los últimos meses deberían ser revisadas por un doctor.

Es muy importante que todas tus parejas sexuales (estables y esporádicas) se hagan un chequeo, ya que si las ITS no se tratan, pueden causar mayores problemas en el futuro.

Si encuentras difícil decírselo a tus parejas, puedes utilizar Let Them Know (letthemknow.org.au) para conseguir ejemplos de conversaciones, correos electrónicos, mensajes de texto y cartas que les puedes enviar tanto de manera personal como anónima.

¿Dónde puedo conseguir ayuda? (Where can I get help?)

- Visita un servicio de salud sexual cercano
- Visita a tu doctor local
- Visita tu centro de salud comunitario local

Encuentra servicios de salud sexual en **StaySTIFree** (staystifree.org.au)

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD (DISCLAIMER)

Esta hoja informativa proporciona información sexual general y no tiene intención de reemplazar la necesidad de consultar con tu doctor.

Si tienes alguna duda acerca de tu salud, busca asesoramiento con tu doctor.

Si necesitas atención urgente, acude a tu Servicio de Emergencias más cercano o llama al 000.