

โรคติดเชื้อไมโครพลาสมา เจนนิทัลเลียม (Mycoplasma genitalium)

ยังเป็นที่ยังไม่รู้จกกันในามว่า MG

โรคติดเชื้อไมโครพลาสมา เจนนิทัลเลียม (Mycoplasma genitalium - MG) เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียที่สามารถติดต่อสู่กันได้ในช่วงการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย

ข้อเท็จจริงโดยสังเขป

- โรคติดเชื้อไมโครพลาสมา เจนนิทัลเลียม เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีผลกระทบต่อปากมดลูก ท่อปัสสาวะ และทวารหนัก
- คนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคติดเชื้อไมโครพลาสมา เจนนิทัลเลียม จะไม่มีอาการใด ๆ ทั้งสิ้น
- การตรวจโรคมักใช้ตัวอย่างปัสสาวะ ก้านสำลีป้ายที่ช่องคลอดหรือปากมดลูก หรือที่ทวารหนัก
- โรคติดเชื้อไมโครพลาสมา เจนนิทัลเลียม รักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะ

โรคนี้คืออะไร? (What is this?)

โรคติดเชื้อไมโครพลาสมา เจนนิทัลเลียม เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากเชื้อแบคทีเรียที่มีผลกระทบต่อปากมดลูก ท่อปัสสาวะ และทวารหนัก

คุณติดโรคนี้ได้อย่างไร? (How do you get it?)

โรคติดเชื้อ MG สามารถติดต่อสู่กันด้วยการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดและทวารหนักโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนที่มีโรคติดเชื้อ MG อยู่ก่อนแล้ว

มีอาการอะไรบ้าง? (What are the symptoms?)

ช่องคลอด (Vagina)

หากคุณมีช่องคลอด คุณอาจพบว่ามี

- อาการปวดท้องน้อยส่วนล่าง
- อาการเจ็บระหว่างมีเพศสัมพันธ์
- สารคัดหลั่งจากช่องคลอดหรือตกขาวอย่างผิดปกติ
- อาการเจ็บแสบตอนถ่ายปัสสาวะ
- การตกเลือดที่ช่องคลอดอย่างผิดปกติ

องคชาต (Penis)

หากคุณมีองคชาต คุณอาจพบว่ามี

- อาการเจ็บแสบตอนถ่ายปัสสาวะ
- สารคัดหลั่งจากองคชาต

คุณจะตรวจโรคนี้ได้อย่างไร? (How do you test for it?)

หากคุณมีช่องคลอด การตรวจโรคมักใช้ตัวอย่างปัสสาวะ ก้านสำลีป้ายที่ช่องคลอดหรือปากมดลูก หรือที่ทวารหนัก

หากคุณมีองคชาต การตรวจโรคมักใช้ตัวอย่างปัสสาวะ

หากคุณติดเชื้อที่ทวารหนัก การตรวจโรคจะให้ก้านสำลีป้ายที่ทวารหนัก

โรคนี้รักษาได้อย่างไร? (How is it treated?)

โรคติดเชื้อ MG มักได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะสองขนาน คุณจำเป็นต้องทานยาทั้งสองขนานเพื่อรักษาการติดเชื้อให้หายขาด

2 - 3 สัปดาห์หลังจากทานยาปฏิชีวนะแล้ว คุณจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะได้ผลแล้ว

คุณไม่ควรมีเพศสัมพันธ์หรือมีจะนั้นต้องใช้ถุงยางอนามัยหรือแผ่นยางอนามัยตลอด 100% ของการมีเพศสัมพันธ์ จนกว่าคุณและคู่นอนของคุณจะมีผลการตรวจโรคติดเชื้อ MG เป็นลบ

ฉันสามารถป้องกันตนเองได้อย่างไร? (How can I protect myself?)

การใช้ถุงยางอนามัยหรือแผ่นยางอนามัยในระหว่างมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดและทวารหนักเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันตัวเองจากโรคติดเชื้อ MG

แจ้งให้พวกเขาทราบ (Let them know)

หากคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) คู่นอนของคุณทุกคนจากหลายเดือนที่ผ่านมาควรไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจด้วยเช่นกัน

เป็นเรื่องสำคัญที่คู่นอนของคุณทุกคน (ขาประจำหรือชั่วคราวชั่วคราว) จะเข้ารับการตรวจ เพราะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้รับการรักษาอาจเป็นเหตุให้เกิดปัญหาร้ายแรงในเวลาต่อมาได้

หากคุณลำบากใจที่จะบอกคู่นอนของคุณ คุณสามารถใช้บริการ แจ้งให้พวกเขาทราบ (letthemknow.org.au) ซึ่งมีตัวอย่างการสนทนา อีเมล ข้อความ หรือจดหมายที่คุณสามารถส่งให้คู่นอนของคุณได้ทั้งแบบส่วนตัวและแบบไม่ระบุชื่อ

ฉันสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ไหนบ้าง? (Where can I get help?)

- ไปที่ศูนย์บริการสุขภาพทางเพศใกล้บ้านคุณ
- ไปพบแพทย์ประจำท้องถิ่นของคุณ
- ไปที่ศูนย์สุขภาพชุมชนในท้องถิ่นของคุณ

ค้นหาบริการด้านสุขภาพทางเพศได้ที่ **StaySTIFree** (staystifree.org.au)

การปฏิเสธความรับผิดชอบ (DISCLAIMER)

เอกสารข้อมูลสำคัญนี้ ให้ข้อมูลด้านสุขภาพทางเพศทั่วไปและไม่มีจุดประสงค์ที่จะไปทดแทนความจำเป็นของการปรึกษากับแพทย์ของคุณ

หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ คุณควรขอคำแนะนำจากแพทย์ของคุณ

หากคุณต้องการการดูแลเร่งด่วน คุณควรไปที่แผนกฉุกเฉินที่อยู่ใกล้คุณที่สุด หรือโทรไปที่ 000