

PEP

亦称暴露后预防药

暴露后预防药 (PEP) 是一种 HIV 药物，在有可能暴露于 HIV 之后 72 小时内开始服用，持续 28 天。

资料快速一览

- 大多数情况下，PEP 能够阻止 HIV 在体内存活，防止出现 HIV 呈阳性的结果
- PEP 可以每天服一片或每天服两到三片不同药物
- 你必须每天服药，连续 28 天，这样 PEP 才能起作用

这是什么药？(What is this?)

大多数情况下，PEP 能够阻止 HIV 在体内存活，防止出现 HIV 呈阳性的结果，但前提是：

- 暴露于 HIV 之后 72 小时内开始进行 PEP 治疗
- 28 天的治疗期内要正确服药

PEP 可以每天服一片或每天服两到三片。

PEP 不是事后避孕药，事后避孕药让不戴避孕套性交变得简单和安全。你必须每天服药，连续 28 天，这样 PEP 才能起作用。这种治疗会带来副作用，比如恶心和头疼。

i 了解 PEP 的详情：Thorne Harbour (thorneharbour.org)

如何得到这种药？(How do you get it?)

大多数公立医院的急诊部、性健康诊所和其他一些专门提供性健康服务的普通诊所都有 PEP。

如果在“下班之后”暴露，最好去急诊部，以确保尽快开始服用 PEP。

i 了解你可以在哪里得到 PEP：GETPEP (getpep.info)

拨打 PEP Phonenumber 的电话 1800 889 887，了解详情。

去哪里寻求帮助 (Where can I get help?)

- 去你附近的性健康诊所

查找性健康服务机构 : **StaySTIFree** (staystifree.org.au)

免责声明 (DISCLAIMER)

本资料单提供普通性健康信息，其意图不是替代咨询医生的需要。

如果你担心你的健康问题，你应该去请教医生。

如果你有紧急需要，你应该去最近的急诊部或拨打 000。