

골반내 염증 질환 (Pelvic inflammatory disease)

PID 로도 알려짐

골반내 염증 질환 (PID)은 골반의 생식 계통의 염증 혹은 감염입니다. PID 는 클라미디아, 임질 및 마이코플라스마 제니탈리움 등의 STI 에 의해 초래될 수 있습니다. PID 는 질과 자궁이 있는 사람들에게만 영향을 미칩니다.

간단한 사실 자료

- 클라미디아 및 임질은 PID 의 가장 흔한 원인입니다
- PID 는 흔하며 종종 증상을 초래하지 않습니다
- 새로운 파트너와는 콘돔을 사용하고 정기적으로 STI 테스트를 받으면 PID 를 예방하는데 도움이 될 수 있습니다
- 치료하지 않고 방치하면 PID 가 나팔관에 상처를 입히고 불임을 초래할 수 있습니다
- PID 는 성적으로 활동적이 아니거나 월경이 없거나 자궁 혹은 난소가 없는 사람에게는 드뭅니다.

이것이 무엇인가요? (What is this?)

PID 는 자궁 및 나팔관을 포함한 골반 내 기관의 감염 혹은 염증입니다.

어떻게 걸리게 되나요? (How do you get it?)

PID 는 클라미디아, 임질 및 마이코플라스마 제니탈리움 등의 세균성 감염에 의해 주로 초래됩니다.

가끔 PID 는 임신 중절 등 골반 수술 후에 발생합니다.

증상이 무엇인가요? (What are the symptoms?)

많은 사람들이 징후 혹은 증상이 없습니다.

증상의 예:

- 비정상적인 질 분비물
- 흔치 않은 출혈
- 골반 혹은 아랫배 통증
- 성관계 시의 통증
- 생리통 증가

어떻게 테스트를 하나요? (How do you test for it?)

PID 는 의료 전문의가 아래 항목을 이용하여 진단합니다.

- 증상 내역
- 검사
- 테스트

테스트는 STI 테스트, 임신 배제 및 가끔 초음파를 포함할 수 있습니다.

어떻게 치료하나요? (How is it treated?)

PID 는 몇 주동안 복합 항생제로 치료합니다.

파트너가 PID 로 진단 받은 경우, 클라미디아, 임질 및 마이코플라스마 제니탈리움을 포함한 STI 테스트를 받아야 합니다.

i StaySTIFree (staystifree.org.au)에서 클라미디아, 임질 및 마이코플라스마 제니탈리움에 대해 더 자세히 알아보세요.

치료하지 않을 경우 합병증이 생기나요? (Are there any complications if not treated?)

치료하지 않은 PID 는 만성 골반 통증을 초래할 수도 있으며 나팔관을 손상시켜 임신을 어렵게 하거나 자궁 외 임신을 초래할 수 있습니다.

연구에 의하면 한 번의 PID 감염이 성공적인 임신 확률을 약 10% 감소시켰을 수도 있습니다. 두 번 혹은 세 번의 감염 후에는 이 수치가 50%까지 증가합니다.

어떻게 자신을 보호할 수 있을까요? (How can I protect myself?)

PID로부터 자신을 보호하는 최상의 방법:

- 새로운 파트너들과의 성관계 시에 콘돔 혹은 댐을 사용합니다
- 정기적 성보건 검진을 받아야 합니다

어디서 도움을 받을 수 있나요? (Where can I get help?)

- 가까운 성보건 서비스를 방문합니다
- 지역 의사를 방문합니다
- 지역 커뮤니티 보건 센터를 방문합니다

StaySTIFree (staystifree.org.au)에서 성 보건 서비스를 찾아 보세요

법적 면제 조항 (DISCLAIMER)

이 안내 자료는 일반적인 성 보건 정보를 제공하며 귀하의 의사와 필수 검진을 대체할 의도는 없습니다.

귀하의 건강에 대한 우려사항이 있을 경우 의사의 조언을 구해야 합니다.

긴급한 치료가 필요한 경우 가까운 응급실로 가거나 000 에 전화해야 합니다.